

# WAT KAN ..... BETER NIET ETEN?



Neem direct contact op met een dierenarts als u gezien heeft (of vermoedt) dat uw hond of kat mogelijk iets giftigs:

- 🐾 heeft gegeten
- 🐾 heeft ingeademd
- 🐾 op de huid heeft gehad





Telefoonnummer van uw dierenarts

.....

# HELP!




Mijn hond heeft mogelijks een gevaarlijk voedingsmiddel gegeten. Wat moet ik doen?

## LOOK-FAMILIE


-  Zowel rauw als bewerkt.
-  Je doggo krijgt last na één of meerdere malen smullen.
-  Problemen kunnen zich in de eerste 24 uur al voordoen, maar zijn meestal pas zichtbaar na enkele dagen.
-  Je doggo heeft bloedarmoede (hemolyse), bleke of gelige slijmvliezen, gedraagt zich slap en sloom, kan overgeven, diarree of buikpijn krijgen en wil niet meer eten. Ook heeft je hond een snelle hartslag en ademhaling.

**Hoeveelheid:** Best niets uit de look-familie opsmullen. Het gifcentrum raadt aan om meteen te starten met een behandeling.



## KRENTEN, ROZIJNEN EN DRUIVEN

-  Altijd giftig voor je doggo, maar ook voor katten en fretten.
-  Problemen starten na 6 tot 24 uur en kunnen nierschade veroorzaken. Hondjes zijn erg gevoelig voor nierfalen.
-  Je viervoeter gaat overgeven en wankelen, krijgt buikpijn, diarree of nierfalen, heeft een slechte eetlust en voelt zich over het algemeen heel slap.




## BROODDEEG

-  Giftig omdat het deeg in de maag rijst. Bovendien produceert het gist alcohol!
-  Je doggo heeft teveel in zijn of haar maag. Dat leidt tot overgeven, een bolle buik, slechte circulatie of zelfs een maagscheur.


## ZOUT (OF ZOUTDEEG)

-  Zout wordt pijlsnel opgenomen in het bloed van je hond. Dit haalt vocht uit de hersenen wat kan leiden tot (fatale) hersenbloedingen.
-  Bel de dierenarts of laat je doggo meteen overgeven na het eten van zout of zoutdeeg.



## MACADAMIANOTEN

-  Altijd giftig voor je doggo.
  -  Problemen doen zich al na 3 uur voor, maar je hond kan na 24 uur weer herstellen.
  -  Je viervoeter heeft last van spierzwakte, trillen en wilt gaan liggen. Ook stijfheid en gewrichtspijn (zonder zwelling) hoort erbij, naast overgeven, buikpijn, bleke slijmvliezen en oververhitting (hyperthermie).
- Hoeveelheid:** één nootje kan al genoeg zijn om je doggo (van 3 kg) ziek te maken.


## AVOCADO

-  Je doggo kan last krijgen van overgeven, buikpijn of diarree. De pit kan bovendien de darmen afsluiten en leiden tot alveesklierontsteking.




## CHOCOLADE EN CAFEINE

-  Giftig voor je hond, maar ook voor je kat. Pure chocolade is gevaarlijker dan melkchocolade, witte chocolade is safe!
-  Je doggo begint te hijgen, te trillen en wordt onrustig. Je hond maakt hoge koorts en kan zelfs overlijden.

## ALCOHOL

-  Je doggo kan last krijgen van gedragsveranderingen, blindheid en andere neurologische klachten (door een te lage bloedsuiker). Alcohol kan zelfs leiden tot dronkenschap bij je hond, coma en de dood.

## HOP

-  Opgepast wanneer je zelf alcohol brouwt!
-  Ga snel naar de dierenarts, want je hond kan binnen 6 uur sterven.
-  Doggo's krijgen het erg warm (hyperthermie) en beginnen te hijgen. Ook een snelle hartslag, pijn, spanning en overgeven horen erbij.

## XYLITOL (PEPERMUNT)



Xylitol is een suikervervanger gebruikt in kauwgom, pepermuntjes, ... Andere suikervervangers als aspartaam, acesulfame, maltitol en sorbitol zijn niet gevaarlijk voor doggo's.



Vanaf 0,1 g/kg kan je hond een lage bloedsuiker en neurologische klachten krijgen. Vanaf 0,5 g/kg zien we acute leverschade (necrose). Je viervoeter geeft over, krijgt diarree, toevallen, een verstoorde bloedstolling en kan overlijden.

## RAUW VLEES



Rauw vlees kan parasieten (Toxoplasma en Neospora), virussen (Aujeszky) en bacteriën (Salmonella) bevatten, en die zijn slecht voor je doggo.



Wanneer je vlees voldoende verhit, dood je deze ziekteverwekkers.



Rauw (orgaan)vlees kan veel hormonen bevatten, denk maar aan schildklierweefsel. Hondjes kunnen hier ziek van worden.

## SLAKKEN EN KIKKERS



Je doggo kan bij het eten van slakken of kikkers de Franse hartworm binnenkrijgen.

## VOGEL- EN VISKADAVERS



Vogels en vissen kunnen overlijden aan botulisme. Wanneer je doggo van de kadavers smult, kan hij of zij ook besmet raken.

## UITWERPSELEN

50% van de honden eet ontlasting



Je doggo kan last krijgen van wormen en de Giardia-parasiet. Bovendien bevat ontlasting ontwormingsmiddelen (paarden), verdovende middelen (mensen), toxoplasmose (katten). Van kattenbakkorrels kan je hond zelfs verstopt raken.

## BLAUWALG



Net zo gevaarlijk voor jou als voor je doggo wanneer hij of zij het via de mond binnenkrijgt (drinken of likken).



Pas op voor misselijkheid, braken, geïrriteerde ogen of neus, spiertrillingen en krampen, leverschade, verminderde ademhaling én zelfs overlijden meteen na contact.

## DIVERSE KAMERPLANTEN, ZOALS DIEFFENBACHIA, KERSTROOS, KERSTSTER, DRACAENA, ...)

Lelie, dieffenbachia, kerstroos, kerstster, dracaena



Je doggo krijgt hier vooral maag- en darmklachten van.



Zorg er vooral voor dat je hond de bloem niet opeet, want die is het meest giftig!

## GIF, MEDICIJNEN, DRUGS, WIET EN SCHOONMAAKMIDDELEN



Afhankelijk van het type middel dat je doggo binnenkrijgt, kunnen verschillende symptomen optreden. Meteen je dierenarts bellen is een must!

## ANTIVRIESMIDDELEN



Gevaarlijk voor honden én katten!



Antivries wordt pas giftig wanneer de lever van je doggo de stof afbreekt. Meteen naar je dierenarts bellen is nodig om nierschade te voorkomen!



Je viervoeter kan in het ergste geval overlijden aan nierfalen.

## SLAKKENBESTRIJDINGSMIDDEL



In slakkenbestrijdingsmiddel zit methaldehyde en dat is giftig voor je doggo.



Je hond kan last krijgen van maag, darmen, een te hoge temperatuur, krampen, maar kan zich ook depressief voelen en zelfs overlijden.

## BELANGRIJKE INFO VOOR DIERENARTS



Leeftijd



Gewicht en ras



Welk giftig middel?



Hoeveel gif?



Hoe lang duurde het contact?



Wanneer is het gebeurd?



Welke symptomen?



Wat heb je zelf al gedaan?



Neem de verpakking mee naar de dierenarts!